

Forbrug af antipsykotisk medicin



Med National Demenshandlingsplan 2025 blev det vedtaget at opsætte et mål om, at brugen af antipsykotisk medicin til mennesker med demens skal være halveret senest i 2025. På den baggrund offentliggør Sundhedsdatastyrelsen hvert år nye tal for udviklingen i brug af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens.

Ordinering af antipsykotisk medicin til mennesker med demens er en lægefaglig opgave, som skal foretages med største forsigtighed, da brugen er forbundet med øget risiko for hyppige og alvorlige bivirkninger.


Dette hænger blandt andet sammen med, at en hjerne med demens som regel bliver mere påvirket af lægemidler end en rask hjerne.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at førstevalgsbehandling af BPSD er nonfarmakologisk. Dette dækker over en bred vifte af interventionsmetoder, der tilpasses individuelt til den enkelte person.


Forbrug af antipsykotisk medicin blandt borgere med demens (+65 år) i kommunerne i 2023



Udvikling i brug af antipsykotisk medicin blandt borgere med demens (+65 år), 2014-2023



Forbrug af antipsykotisk medicin blandt borgere med demens (+65 år) i regionerne, 2014-2023



Fire råd om antipsykotisk medicin og demens

Vær opmærksom på følgende, inden evt. iværksættelse af medicinsk behandling:

1. Find eventuelle fysiske årsager

Pludseligt opståede symptomer har ofte en fysisk årsag – fx infektioner, smerter, delirium, medicindosis eller kombinationen af præparater, tab af syn eller hørelse.

2. Se mennesket bag sygdommen

Forebyg mistroivsel ved at opfylde personens fysiske eller psykiske behov. Er omgivelserne optimale for personen? Er der noget i plejen eller kommunikationen med personen, der kan forbedres?

3. Observer, reflekter og juster

Læg en individuel personcentret handleplan og justér løbende indsatsen.

4. Overvej kun medicinsk behandling hvis andre tiltag ikke virker

Antipsykotisk medicin har ofte ringe effekt ved adfærdsforstyrrelser hos personer med demens. Medicinen skal bruges med stor forsigtighed pga. risiko for svære bivirkninger. Husk derfor: Lav dosis, plan for observation af virkning og bivirkning og stop-dato.

Kilder



Esundhed.dk

esundhed.dk

Senest opdateret: 18. maj 2022