

Hallucinationer

Op imod halvdelen af patienterne med Alzheimers sygdom oplever hallucinationer i løbet af sygdomsudviklingen.

Synshallucinationer er langt den hyppigste form, men også hallucinationer, der involverer hørelse, lugtesans eller følesans forekommer. Følehallucinationer kan fx dreje sig om små dyr, der bevæger sig omkring på kroppen. Hørelsesshallucinationer med fremmede stemmer, der kommenterer situationen eller omtaler patienten i tredje person, forekommer yderst sjældent. Nedsat syn og hørelse kan forstærke tendensen til hallucinationer og vrangforestillinger, og problemet kan undertiden afhjælpes med nye briller eller et høreapparat.

Lewy body demens

Ved Lewy body demens udgør synshallucinationerne et kardinalsymptom, der ofte dukker op allerede i begyndelsen af sygdomsforløbet. Der er typisk tale om virkelighedstro, detaljerede 'syner', der indeholder mennesker eller dyr. Personen med demens oplever måske, at forældrene eller en afdød ægtefælle sidder tavs i stuen ('enkesyner') uden, at det virker særligt påfaldende eller skræmmende. Hvis man taler til dem, svarer de ikke, men forsvinder ofte.

Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens. København; 2019

[Sundhedsstyrelsen](#)

Forstå demens. 2. ed. København: Hans Reitzels Forlag; 2011

[Hans Reitzel](#)

Senest opdateret: 12. august 2020