

Basisundersøgelser

En demensdiagnose stilles på baggrund af en række forskellige undersøgelser og tests.

I nogle tilfælde er en basisundersøgelse nok til at stille en diagnose. Men er der tale om lette eller atypiske symptomer eller forløb, en anden komplicerende sygdom eller andre forhold, der gør diagnosen usikker, bør der foretages supplerende udredning.

Læs mere om basisundersøgelse:

[Kognitiv vurdering](#)

[Korte kognitive test](#)

[Vurdering af den psykiske tilstand](#)

[Funktionsevne i hverdagen](#)

[Omsorgsgiverbelastning](#)

[Laboratorieprøver](#)

[Gå til Faglige redskaber til udredning af demens](#)

National klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens. København: Sundhedsstyrelsen; 2018. Anbefalingerne er ikke længere gældende.

[Sundhedsstyrelsen](#)

Hasselbalch SG. State of the art-udredning af demens. Ugeskr Læger. 2017;179(12)

[PubMed](#)

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens. København: Sundhedsstyrelsen; 2013. Anbefalingerne er ikke længere gældende.

[Sundhedsstyrelsen](#)

Demens i almen praksis. Klinisk vejledning. København: Dansk Selskab for Almen Medicin; 2006

[Dansk Selskab for Almen Medicin](#)



Senest opdateret: 20. marts 2023