

## Fire råd om antipsykotisk medicin og demens

Godt 20 % af alle ældre med demens får udskrevet antipsykotisk medicin – ofte til behandling af adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer.

Vær opmærksom på følgende, inden evt. iværksættelse af medicinsk behandling:

1. **Find eventuelle fysiske årsager**

Pludseligt opståede symptomer har ofte en fysisk årsag – fx infektioner, smerter, delirium, medicindosis eller kombinationen af præparater, tab af syn eller hørelse.

2. **Se mennesket bag sygdommen**

Forebyg mistroisvel ved at opfylde personens fysiske eller psykiske behov. Er omgivelserne optimale for personen? Er der noget i plejen eller kommunikationen med personen, der kan forbedres?

3. **Observer, reflekter og juster**

Læg en individuel personcentret handleplan og justér løbende indsatsen.

4. **Overvej kun medicinsk behandling hvis andre tiltag ikke virker**

Antipsykotisk medicin har ofte ringe effekt ved adfærdsforstyrrelser hos personer med demens. Medicinen skal bruges med stor forsigtighed pga. risiko for svære bivirkninger. Husk derfor: Lav dosis, plan for observation af virkning og bivirkning og stop-dato.

### Kilder

Lolk A, Andersen K. Udredning og behandling af adfærdsforstyrrelser hos demente. Ugeskrift for Læger. 2017;179(12).

[PubMed](#)

**Bedre behandling og pleje af mennesker med demens med adfærdsmæssige og psykiske symptomer.**



[Hent vejledningen her](#)

Senest opdateret: 12. oktober 2022