

Globale vurderingsinstrumenter

Globale kliniske vurderingsinstrumenter tilstræber en vurdering af demensgrad eller en stadietildeling af forløbet ved demensudvikling. De anvendes primært ved vurdering af effekt (outcome) af en intervention.

Se fire globale kliniske vurderingsinstrumenter:

[Alzheimer's Disease Cooperative Study-Clinical Global Impression of Change](#)

[Clinical Dementia Rating \(CDR\)](#)

[Global Deterioration Scale](#)

[Gottfries-Bråne-Steen skalaen \(GBS\)](#)

For en mere omfattende oversigt over instrumenter og metoder til vurdering af demens henvises til tre rapporter fra Horsted & Christiansen (2004), hvor også instrumenter til vurdering af ADL-funktioner, adfærdsmæssige og psykologiske symptomer, omsorgsbyrde samt livskvalitet bliver gennemgået med vægt på de psykometriske aspekter.

En særdeles omfattende, men knap så detaljeret oversigt over vurderingsinstrumenter foreligger i Burns (2004).

Kilder

Burns, A., Lawlor, B., & Craig, S. (2004). *Assessment Scales in Old Age Psychiatry*. (2nd ed.) London: Martin Dunitz, Taylor & Francis Group.

[Routledge](#)

Horsted, C. & Christiansen, T. (2004). *Metoder og instrumenter til effektvurdering af indsatser over for demente – en oversigt (Rapport nr. 2)*. Odense: Syddansk Universitet.

[Health Economics Papers](#)

Horsted, C. & Christiansen, T. (2004). *Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente - psykometriske begreber (Rapport nr. 3)*. Odense: Syddansk Universitet.

[Health Economics Papers](#)

Horsted, C. & Christiansen, T. (2004). *Mulige metoder og instrumenter til effektvurdering af indsatser over for demensramte patienter – gennemgang og beskrivelse af instrumenterne (Rapport nr. 4)*. Odense:



Syddansk Universitet.

[Docplayer](#)

Senest opdateret: 06. august 2020