

Rating af livskvalitet

Instrumenter til rating af livskvalitet ved demens anvendes især i forbindelse med forskning.

I Danmark er de hyppigst anvendte instrumenter formentlig:

- Quality of life in Alzheimer's Disease (QoL-AD)
- EuroQoL-5 Domain (EQ-5D)

Der findes adskillige andre ratinginstrumenter til formålet. For en oversigt henvises til fx til Burns m.fl. (2004) eller til Horsted og Christiansen (2004).

QoL-AD er udviklet specifikt til rating af livskvalitet hos ældre med demens, hvorimod EQ-5D er et såkaldt generisk (det vil sige ikke-sygdomsspecifikt eller alment) ratinginstrument.

Forkortelse	Formål	Målgruppe	Administrationsmåde
(QoL-AD)	Rating af livskvalitet	Ældre med demens	Interviewbaseret samt rating ved omsorgsgiver
(EQ-5D)	Rating af helbredsrelateret livskvalitet	Alle	Selvrating samt rating ved omsorgsgiver

Formålet med at beskrive de to instrumenter er at give forskere inden for demensområdet et beslutningsgrundlag for at vælge det rette instrument til formålet. Begge instrumenter har været anvendt i danske forskningsprojekter inden for demensområdet, bl.a. Odenseundersøgelsen om forekomst af demens og the Danish Alzheimer Intervention Study (DAISY) (jf. referencerne nedenfor).

Materialer

Begge rating-instrumenter er beskyttet af copyright og må ikke lægges på herværende hjemmeside. Find nærmere oplysninger under beskrivelsen af de enkelte instrumenter eller kontakt neuropsykologisk fagkonsulent [Kasper Jørgensen](#). (Obs: Denne mail sendes ikke krypteret og må derfor ikke indeholde personfølsomme oplysninger.)

Se redskab til vurdering af rating af livskvalitet:

[Quality of life in Alzheimer's Disease](#)

Kilder

Burns A, Lawlor B, Craig S. Assessment scales in old age psychiatry. 2nd ed. London, New York: Martin Dunitz, Taylor & Francis Group; 2004.

[Routledge](#)

Horsted C, Christiansen T. Mulige metoder og instrumenter til effektvurdering af indsatser over for demensramte patienter - gennemgang og beskrivelse af instrumenterne. Syddansk Universitet; 2004. Report No.: 4.

[Docplayer](#)

Andersen CK, Wittrup-Jensen KU, Lolk A, Andersen K, Kragh-Sorensen P. Ability to perform activities of daily living is the main factor affecting quality of life in patients with dementia. Health Qual Life Outcomes 2004;2:52.

[PubMed](#)

Vogel A, Mortensen EL, Hasselbalch SG, Andersen BB, Waldemar G. Patient versus informant reported quality of life in the earliest phases of Alzheimer's disease. Int J Geriatr Psychiatry 2006 Dec;21(12):1132-8.

[PubMed](#)

Bhattacharya S, Vogel A, Hansen ML, Waldorff FB, Waldemar G. Generic and disease-specific measures of quality of life in patients with mild Alzheimer's disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2010;30(4):327-33.

[PubMed](#)

Vogel A, Bhattacharya S, Waldorff FB, Waldemar G. Proxy-rated quality of life in Alzheimer's disease: a three-year longitudinal study. Int Psychogeriatr 2012 Jan;24(1):82-9.

[PubMed](#)

Senest opdateret: 06. august 2020