

Emneoversigt

ARTIKEL

Fire råd om antipsykotisk medicin og demens

Godt 20 % af alle ældre med demens får udskrevet antipsykotisk medicin – ofte til behandling af adfærdsforstyrrelser og psykiske...

ARTIKEL

Antipsykotisk behandling ved demens

På trods af alvorlige bivirkninger anvendes antipsykotiske lægemidler relativt hyppigt til behandling af psykotiske symptomer, uro, aggression og andre adfærdsændringer...

ARTIKEL

Angstdæmpende behandling ved demens

Effekten af behandling med benzodiazepiner mod adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens er ikke særlig velundersøgt.

ARTIKEL

Antidepressiv behandling ved demens

Antidepressive lægemidler anvendes ikke kun til behandling af depression ved demens, men også til behandling af angst, uro, irritabilitet og...

ARTIKEL

Medicinsk behandling af psykiatriske symptomer ved demens

Hvis ikke-farmakologisk behandling er uden effekt, eller hvis der foreligger en egentlig psykisk lidelse, som patienten virker forpint af, kan...

ARTIKEL

Ikke-farmakologisk behandling af psykiatriske symptomer ved demens

Behandling af psykiatriske symptomer og adfærdsforstyrrelser forudsætter en systematisk udredning og ofte også en løbende evaluering af, hvordan behandlingen virker...

ARTIKEL

Udredning af psykiatriske symptomer ved demens

Formålet med udredning af psykiatriske symptomer og adfærdsforstyrrelser hos personer med demens

ARTIKEL

Vejledning i behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens

er nøje at identificere de bagvedliggende årsager, så...

Vejledningen er for personale i sundhedssektoren og ældreplejen, som arbejder med mennesker med demens med adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Vejledningen...

ARTIKEL

Behandling af psykiatriske symptomer ved demens

Behandling af psykiske symptomer og adfærdsforstyrrelser ved demens med psykofarmaka er ofte uden effekt og kan indebære betydelige bivirkninger. Ikke-farmakologisk...

ARTIKEL

Vurdering af den psykiske tilstand

Neuropsykiatriske symptomer forekommer hyppigt ved demens og udgør en væsentlig belastning for patienter og pårørende. Det kan fx være depression...