

Emneoversigt

NYHED

11. marts 2025

Forbrug af antipsykotisk medicin til borgere med demens på plejehjem kan mindskes

En ny erfaringsopsamling fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at et tæt samarbejde mellem læger og plejepersonale kan bidrage til at...

ARTIKEL

Forbrug af antipsykotisk medicin

Med den Nationale Demenshandlingsplan 2025 blev der opstillet et nationalt mål om at halvere forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker...

NYHED

09. december 2024

Lidt færre ældre med demens behandles med antipsykotisk medicin

Sidste år sås et diskret fald i andelen af ældre borgere med demens i behandling med antipsykotisk medicin. Selvom udviklingen...

NYHED

25. oktober 2024

Samarbejde, der skal nedbringe forbruget af antipsykotika til mennesker med demens, har taget et vigtigt skridt fremad

Af læger, til læger. Det er essensen af et samarbejde mellem Nationalt Videnscenter for Demens og KiAP, der skal nedbringe...

NYHED

10. juni 2024

Nyt samarbejde skal nedbringe forbruget af antipsykotika til mennesker med demens

Forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens er fortsat højt og med stor geografisk variation på tværs af landet...

NYHED

22. november 2023

Stor international variation i forbrug af antipsykotisk medicin blandt ældre

Ordination af antipsykotiske lægemidler til ældre varierer med en faktor fem eller mere på tværs af OECD-landene ifølge en nylig...

NYHED

31. oktober 2023

NYHED

10. juli 2023

Store udfordringer med at mindske forbruget af antipsykotisk medicin til personer med demens

En ny rapport udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen analyserer tallene bag forbruget af antipsykotisk medicin blandt ældre med demens i perioden 2014-2022...

Uændret højt forbrug af antipsykotisk medicin blandt ældre med demens

Den nyligt udkomne årlige statusrapport om nationale mål for sundhedsvæsnen viser, at andelen af ældre med demens, der behandles med...

NYHED

07. februar 2022

Dementia and antipsychotics are a deadly mixture

Antipsychotic treatment among people with dementia increase mortality within six months by 35 percent. That is the conclusion in a...

NYHED

07. februar 2022

Demens og antipsykotika er en dødelig blanding

Brug af antipsykotika til mennesker med demens forøger dødeligheden inden for et halvt år med 35 procent. Det viser ny...