

NYHED

25. oktober 2024

Samarbejde, der skal nedbringe forbruget af antipsykotika til mennesker med demens, har taget et vigtigt skridt fremad

Af læger, til læger. Det er essensen af et samarbejde mellem Nationalt Videnscenter for Demens og KiAP, der skal nedbringe...

NYHED

10. juni 2024

Nyt samarbejde skal nedbringe forbruget af antipsykotika til mennesker med demens

Forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens er fortsat højt og med stor geografisk variation på tværs af landet..

NYHED

22. november 2023

Stor international variation i forbrug af antipsykotisk medicin blandt ældre

Ordination af antipsykotiske lægemidler til ældre varierer med en faktor fem eller mere på tværs af OECD-landene ifølge en nylig...

NYHED

31. oktober 2023

Store udfordringer med at mindske forbruget af antipsykotisk medicin til personer med demens

En ny rapport udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen analyserer tallene bag forbruget af antipsykotisk medicin blandt ældre med demens i perioden 2014-2022...

NYHED

10. juli 2023

Uændret højt forbrug af antipsykotisk medicin blandt ældre med demens

Den nyligt udkomne årlige statusrapport om nationale mål for sundhedsvæsenet viser, at andelen af ældre med demens, der behandles med...

ARTIKEL

Forbrug af antipsykotisk medicin

Med National Demenshandlingsplan 2025 blev det vedtaget at opsætte et mål om, at brugen af antipsykotisk medicin til mennesker med...

NYHED

07. februar 2022

NYHED

07. februar 2022

Dementia and antipsychotics are a deadly mixture

Antipsychotic treatment among people with dementia increase mortality within six months by 35 percent. That is the conclusion in a...

Demens og antipsykotika er en dødelig blanding

Brug af antipsykotika til mennesker med demens forøger dødeligheden inden for et halvt år med 35 procent. Det viser ny...

NYHED

24. september 2021

Stadig mange mennesker med demens får antipsykotisk medicin

Der er de seneste år registreret et lille fald i andelen af mennesker med demens som medicineres med antipsykotika. Men...

NYHED

01. juli 2020

Samtidig behandling med antipsykotika og benzodiazepiner associeret med øget dødelighed

Kombinationen af antipsykotisk medicin og benzodiazepiner er associeret med øget dødelighed blandt patienter med demens, hvis man sammenligner med behandling...