

Emneoversigt

ARTIKEL

Symptomer ved demens ved Parkinsons sygdom

Demens ved Parkinsons sygdom udvikles gradvist og snigende og følger efter mere afgrænsede forstyrrelser af de kognitive funktioner. Især kognitive...

ARTIKEL

Symptomer ved Lewy body demens

Neuropsykiatriske symptomer forekommer hyppigt ved Lewy body demens. Rundt regnet oplever 50-70 % af patienterne visuelle hallucinationer, typisk i form...

ARTIKEL

Adfærdsforstyrrelser ved frontotemporal demens

Ved adfærdsvarianten af frontotemporal demens udgør ændringer i adfærd og personlighed de første symptomer.

ARTIKEL

Symptomer ved vaskulær demens

Symptomerne ved vaskulær demens er meget varierende, idet vaskulære læsioner kan ramme alle dele af hjernen. Hvis årsagen er en...

ARTIKEL

Hallucinationer

Op imod halvdelen af patienterne med Alzheimers sygdom oplever hallucinationer i løbet af sygdomsudviklingen.

ARTIKEL

Vrangforestillinger

Psykotiske symptomer forekommer hos 30-50 % af patienterne med Alzheimers sygdom. Vrangforestillinger og hallucinationer udgør de mest almindelige psykotiske symptomer...

ARTIKEL

Aggression og agitation

Aggressiv, udadreagerende adfærd fra patientens side opleves ofte som en alvorlig belastning af pårørende og personale. Der kan være flere...

ARTIKEL

Apati

Et hyppigt forekommende psykiatrisk symptom ved demens er apati. Manglende initiativ og motivation, ligegyldighed, følelsesmæssig ligegyldighed (indifferens), nedsat interesse for...

ARTIKEL

ARTIKEL

Depression

Demens og depression har et vist symptomoverlap, og det kan i praksis være vanskeligt at vurdere, om fx svigtende initiativ...

Årsager til psykiatriske symptomer ved demens

Det er ofte vanskeligt at skelne mellem psykiatriske symptomer som led i almindelig demensudvikling og delirium, idet både symptomer og...