



# Emneoversigt

ARTIKEL

## Behandling af Mild Cognitive Impairment (MCI)

Kolinesterasehæmmere mindsker ikke risikoen for at udvikle demens væsentligt, hvis man i forvejen har mild cognitive impairment (MCI).

Kolinesterasehæmmere ser...

ARTIKEL

## NIA-AA diagnosekriterier for mild cognitive impairment (MCI)

En arbejdsgruppe nedsat af the National Institute on Aging (NIA) og Alzheimer's Association (AA) offentliggjorde i maj 2011 reviderede og...

ARTIKEL

## Behandling af MCI

Kliniske forsøg med lægemidler mod demens (kolinesterasehæmmere) på den kognitive forringelse ved mild cognitive impairment har givet overvejende negative resultater...

ARTIKEL

## Forekomst og forløb af MCI

Forekomsten af mild cognitive impairment (MCI) i befolkningsundersøgelser udviser stor variation, hvilket formentlig afspejler metodemæssige forskelle og forskelle i definitioner...

ARTIKEL

## Historie og undertyper af MCI

Mild cognitive impairment (MCI) er karakteriseret ved svækkelse af en eller flere kognitive funktioner som fx hukommelse, forarbejdningstempo, sprog, visuelt-rumlige...

ARTIKEL

## Mild cognitive impairment (MCI)

Betegnelsen mild cognitive impairment ('let kognitiv svækkelse') angiver, at de mentale funktioner er mere svække end normalt for alderen, men...

NYHED

06. juli 2020

## Hvad er mild behavioral impairment?

Svigtende motivation eller nedsat impulskontrol hos ældre personer uden tegn på kognitiv svækkelse kan være et tidligt varsel om udvikling...

ARTIKEL

## Om demenssygdomme

Demens er tegn på sygdom i hjernen og viser sig ved svække kognitive funktioner. Demens rammer oftest personer over 65...

