

Emneoversigt

ARTIKEL

Søvnbesvær

Dårlig eller manglende søvn udgør en risikofaktor for senere udvikling af kognitiv svækkelse og Alzheimers sygdom.

ARTIKEL

Nedsat hørelse

Ukorrigeret høretab er associeret med øget risiko for udvikling af kognitiv svækkelse og demens senere i livet. Men anvendelse af...

NYHED

28. august 2020

Risiko for demens kan påvirkes

Op imod 40% af alle demenstilfælde skyldes risikofaktorer, som vi selv har mulighed for at påvirke. Det vurderer en ekspertgruppe...

ARTIKEL

Opløsningsmidler

Organiske opløsningsmidler og affedningsmidler er skadelige for hjernen (neurotoksiske). Det er dog uklart, om erhvervsmæssig eksponering for opløsningsmidler er associeret...

ARTIKEL

Mobiltelefoni

Brug af mobiltelefon er hverken forbundet med øget risiko for senere udvikling af demens eller øget risiko for hjernetumor.

ARTIKEL

Luftforurening

Mangeårig eksponering for luftforurening øger ifølge befolkningsundersøgelser risikoen for udvikling af demens på langt sigt. Det drejer sig bl.a. om...

ARTIKEL

Metaller

Evidensen vedrørende eksponering for metaller i miljøet er præget af enten modstridende resultater eller fravær af sammenhæng mellem eksponering og...

ARTIKEL

Kemikalier

Befolkningsundersøgelser tyder på, at det at blive eksponeret for forskellige typer kemikalier i forbindelse med ens erhverv kan være forbundet...

ARTIKEL

Pesticider

Sammenhængen mellem at blive eksponeret for pesticider (sprøjtegifte, afløvningsmidler og andre

ARTIKEL

Elektromagnetiske felter

Eksponering for lavfrekvente og ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter er ifølge



miljøgifte) og risikoen for udvikling af demens senere i...

observationsstudier associeret med signifikant øget risiko for demens.