

Emneoversigt

ARTIKEL

EEG

Elektroencefalografi (EEG) er indiceret ved mistanke om epilepsi som årsag til gentagne tilfælde af forbigående kognitiv dysfunktion.

ARTIKEL

Undersøgelse af rygmarvsvæsken

Rygmarvsvæsken (cerebrospinalvæsken) omgiver og beskytter hjernen og rygmarven. Ved at stikke en lille kanyle ind mellem to ryghvirvler (lumbalpunktur) kan...

ARTIKEL

Neuropsykologisk undersøgelse

En neuropsykologisk undersøgelse er en detaljeret og systematisk undersøgelse af mentale funktioner som hukommelse, koncentration, rumopfattelse, sprogfærdighed, problemløsning m.v.

ARTIKEL

Supplerende undersøgelser

Hvis den basale undersøgelse ikke giver tilstrækkelig diagnostisk afklaring, kan udredningen suppleres med en eller flere specialundersøgelser.

ARTIKEL

Laboratorieprøver

Blodprøver og elektrokardiogram (ekg) indgår som rutineundersøgelser i demensudredning. Blodprøver anvendes primært til afklaring af eventuelle andre sygdomme (komorbiditet), der...

ARTIKEL

Omsorgsgiverbelastning

At være pårørende eller omsorgsgiver til en person med demens kan være forbundet med en betydelig og langvarig psykosocial belastning...

ARTIKEL

Funktionsevne i hverdagen

En demensdiagnose forudsætter, at den kognitive svækkelse har et omfang, så praktiske aktiviteter i hverdagen (activities of daily living, ADL)...

ARTIKEL

Vurdering af den psykiske tilstand

Neuropsykiatriske symptomer forekommer hyppigt ved demens og udgør en væsentlig belastning for patienter og pårørende. Det kan fx være depression...

ARTIKEL

Kognitiv vurdering

ARTIKEL

Basisundersøgelser

En demensdiagnose forudsætter, at der kan påvises kognitiv svækkelse. En systematisk vurdering eller 'måling' af det kognitive funktionsniveau udgør således...

En demensdiagnose stilles på baggrund af en række forskellige undersøgelser og tests.