

Gælder alle
patienter
med nedsat
kognitiv funktion



NATIONALT
VIDENSCENTER
FOR DEMENS



SENSORISK OVERSTIMULATION

- ? Har patienten brug for mere rolige omgivelser?
- ! Ryd op på stuen. Sørg for, at der kun er få personer omkring patienten. Sluk for støjende apparater, og tilbyd enestue hvis muligt

BIVIRKNINGER AF MEDICIN

- ? Er der sket ændringer i patientens medicin?
- ! Vær særlig opmærksom på antipsykotisk eller beroligende medicin og læg evt. en plan for pausering eller seponering

URO HOS PATIENTER MED DEMENS

Har du overvejet,
hvad det kan skyldes?

SENSORISK UNDERSTIMULATION

- ? Har patienten brug for meningsfuld aktivitet?
- ! Spørg patient og pårørende om dagligdags vaner og aktiviteter. Benyt evt. afdelingens aktivitetskasse

FYSISK SYGDOM

- ? Har patienten fx UVI, obstipation, fysisk ubehag eller smerter?
- ! Læg hurtigst muligt en plan for udredning og behandling

UHENSIGTSMÆSSIGE ARBEJDSGANGE

- ? Opstår eller forværres uroen i særlige situationer?
- ! Gennemgå dokumentation. Er der et mønster? Sker det fx altid om eftermiddagen eller ved forflytninger? Overvej, hvad der kan gøres anderledes